


PREZYDENT MIASTA
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie

WER.0003.25.2017



Dąbrowa Górnicza, 28.06.2017r.

Sr. P. Reszke
Pan Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dot.: interpelacji z dnia 05.06.2017 roku (znak BRM.0003.1875.2017), w sprawie wystąpienia krocionogów w dzielnicach: Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łęka i Łosień.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 05.06.2017r., w sprawie wystąpienia krocionogów w dzielnicach: Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łęka i Łosień informuję, że podjęta została decyzja o odbiorze przez firmę ALBA MPGK zebranych przez właścicieli nieruchomości krocionogów, w uzgodnionych terminach.

Ponadto Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zleciło wykonanie oprysku środkiem chemicznym budynków mieszkalnych wraz z terenem wokół budynków w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Zabieg przeprowadziła specjalistyczna firma w dniu 24.06.2017r.

Niezależnie od powyższego informuję, że na terenie naszego miasta zjawisko pojawienia się krocionogów występuje od kilkunastu lat z różnym nasileniem. Żyjąc w wierzchniej warstwie gleby odżywiają się butwiejącymi szczątkami roślin, pędami kielkujących nasion, młodymi korzonkami, owocami, bulwami i grzybami. Zasiedlają zwykle wilgotne miejsca tj. środowiska leśne i zaroślowe, łąki i pola preferując wprawdzie stanowiska na otwartym terenie trawiastym i ugorach.

Przyczynami ich występowania jest zaprzestanie rolniczej działalności gospodarczej skutkującej powstawaniem takich zbiorowisk oraz sukcesją zarośli na opuszczonych polach i łąkach. Ze względu na zdolności przystosowania się do zmiennych warunków pogodowych tolerują zarówno zimno i ciepło, a także środowiska suche i mokre. Stanowi to więc o występowaniu m.in. na terenie naszej gminy dogodnych miejsc do rozwoju populacji krocionoga i sprzyja to jego ekspansji na dalsze, nawet odległe tereny.

Ze względu na bardzo niską lub krótkotrwałą skuteczność stosowania do ich zwalczania środków chemicznych zaleca się podejmowanie przez właścicieli prywatnych gruntów działań profilaktyczno - zapobiegawczych, które mogą ograniczyć występowanie krocionoga ale nie mogą w 100% wyeliminować jego pojawienia się.

Najbardziej skutecznymi metodami w zwalczaniu krocionogów są działania profilaktyczno - higieniczne tj.:

- regularne koszenie trawy;
- usuwanie gałęzi drzew, wysokich chwastów, pnączy przylegających do budynków, oraz opadających owoców;
- uporządkowanie posesji poprzez usunięcie resztek roślinnych, żywnościowych, elementów stałych zmruszałych desek, co stwarza dogodne warunki wilgotnościowe dla rozwoju krocionogów;

- dbałość i szczelność pojemników na odpady komunalne z uwzględnieniem ich regularnego opróżniania.

Proponuje się w okresie wędrówek krocionogów montowanie na ścianach budynków (na wysokości około 10 cm) odwróconych rynien lub innych profilowanych listew o gładkiej powierzchni. Jeżeli warunki terenowe pozwalają, można wokół budynku wkopać niski ekran ze sztywnej, gładkiej folii. Jego płaszczyzna powinna być lekko pochylona na zewnątrz i co najmniej o 10 cm przewyższać poziom gruntu lub trawnika, a ewentualne paliki podtrzymujące muszą być wbite od strony budynku. Budowanie pułapek nęcących, polegających na umieszczeniu w zagłębieniu terenu bulw ziemnych lub marchwi, wokół których gromadzą się krocionogi. Po kilku dniach pułapki należy usunąć i zniszczyć. Rozkładanie przynęt pochodzących z otrąb, cukru i insektycydu. Można zastosować również pokrojoną sałatę lub rzodkiewkę opryskaną fosfloreem płynnym 25. Przynęty po kilku dniach należy usunąć i zniszczyć.

Wspomaganie naturalnych procesów przyrodniczych poprzez stwarzanie dogodnych warunków dla rozrodu i migracji zwierząt owadożernych, drobnych ptaków czy płazów, wieszanie budek dla ptaków, ochrona zadrzewień i zakrzewień, przyczynia się do ograniczania liczebności krocionogów. Do naturalnych wrogów krocionogów należą m.in. żaba moczarowa i żaba trawna, ropucha szara, niektóre ptaki, jak np. szpak i cierniówka, a także jeże.

Zaleca się również utrzymywanie terenów rolniczych w użytkowaniu (koszenie, uprawa) lub przynajmniej wykaszanie lub zaorywanie ugorów na pasach o szerokości kilku metrów, utrzymywanie rowów, utrudnia krocionogom wędrówki i bytowanie na danym terenie. Sprawdzonym zabiegiem jest również wapnowanie gleby zasiedlonej przez krocionogi wapnem palonym, a także ogrodzenia ażurowe, z prześwitami 12 cm nad powierzchnią terenu zapewniają dostęp jeżom i innym niewielkim zwierzętom.

Wobec braku środka chemicznego o skutecznym i długotrwałym działaniu, zaleca się stosowanie opisanych wyżej zabiegów profilaktyczno – higienicznych, które mają na celu ograniczenie ich rozwoju i liczebności na posesjach i w budynkach, poprzez stwarzanie warunków utrudniających ich bytowanie i odcięcie od dostępu do wody i pokarmu.

Przystawione sposoby ograniczania występowania krocionogów na terenach prywatnych posesji są najbardziej efektywnymi metodami ich zwalczania.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA
Damian Rutkowski

Otrzymują do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej.
2. Wydział Administracyjny - Referat Organizacyjny.